

ÉRZÉSTELENÍTÉS ÉS ALTATÁS A SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEKBEN

DR. RÓZSA CSILLA

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Budapest



Az SM betegek élete során is szükségessé válhat műtéti, szülészeti beavatkozás, vagy valamilyen kórállapot, mely során érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást kell alkalmazni.

A műtétek, és a velük járó érzéstelenítés nem jelent fokozott kockázatot az SM betegség aktiválódása szempontjából és nem veszélyesebb egy SM-mel élő egyén számára, mint a többi, hasonló korú beteg esetében.

Érzéstelenítés

- **általános érzéstelenítés**, más néven „altatás”
 - a műtét alatti, alváshoz hasonló (tudatvesztéssel járó) állapotban, melyet gyógyszerekkel idéznek elő, a beavatkozás során a beteg nem érzékeli a fájdalmat és nem is emlékszik utána a beavatkozásra;
- **regionális érzéstelenítés**: az érzékelés gátlása egy bizonyos testrész területén, az adott területet ellátó ideg vagy ideg-hálózat blokkolása révén (pl. fogászati helyi érzéstelenítés), vagy gerincvelő-szakasz gyógyszeres blokkolása révén (epidurális vagy spinális érzéstelenítés, mely során a gerincvelő közelébe juttatják be az érzéstelenítőt, aminek hatására a test alsó része érzéketlenné válik);
- **„éber nyugtatás”** – felszínes altatás a fájdalom és kellemetlen érzések minimalizálása érdekében;



